【4-6 評価シート 観察研究】

| | |
|---|---|
| **診療ガイドライン** | CQ1抗がん薬投与における用量調節のための腎機能評価にeGFRは推奨されるか？ |
| **対象** | 抗癌剤投与を行う癌患者 |
| **介入** | CG式でCcrを測定 |
| **対照** | 推定GFR値を測定 |

*バイアスリスク、非直接性
　各ドメインの評価は"高(-2)"、"中/疑い(-1)"、"低(0)"の3段階
　まとめは"高(-2)"、"中(-1)"、"低(0)"の3段階でエビデンス総体に反映させる
** 上昇要因
　各項目の評価は"高(+2)"、"中(+1)"、"低(0)"の3段階
　まとめは"高(+2)"、"中(+1)"、"低(0)"の3段階でエビデンス総体に反映させる
各アウトカムごとに別紙にまとめる

| **アウトカム** | | 有用か | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **個別研究** | | **バイアスリスク*** | | | | | | | **上昇要因**** | | | | **非直接性*** | | | | | **リスク人数(アウトカム率)** | | | | | | | | |
| | | **選択バイアス** | **実行バイアス** | **検出バイアス** | **症例現象バイアス** | **その他** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **研究コード** | **研究デザイン** | **背景因子の差** | **ケアの差** | **不適切なアウトカム測定** | **不完全なフォローアップ** | **不十分な交絡の調整** | **その他のバイアス** | **まとめ** | **量反応関係** | **効果減弱交絡** | **効果の大きさ** | **まとめ** | **対象** | **介入** | **対照** | **アウトカム** | **まとめ** | **対照群分母** | **対照群分子** | **(%)** | **介入群分母** | **介入群分子** | **(%)** | **効果指標(種類)** | **効果指標(値)** | **信頼区間** |
| Tsao CK 2012 | コホート研究 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | | | | | | | -1 | -1 | -1 | 0 | | 116 | 116 | | 116 | 116 | | prevalence | 1.17 | 1.03-1,34 |
| Tanaka Y 2009 | コホート研究 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | | | | | | | -1 | -1 | -1 | -1 | | 101 | 101 | | 101 | 101 | | | | |
| Jennings S 2010 | コホート研究 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | | | | | | | -2 | -1 | -1 | -1 | | 313 | 313 | | 313 | 313 | | | | |
| Launay-Vacher V | コホート研究 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | | | | | | | -1 | -1 | -1 | -1 | | 445 | 445 | | 445 | 445 | | | | |
| Launay-Vacher V | コホート研究 | -2 | -1 | -2 | -2 | | | | | | | | -2 | -1 | | -1 | | 316 | 316 | | 316 | 316 | | | | |

**コメント(該当するセルに記入)**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tsao CK 2012 | 後ろ向き | 単施設 | 疑われる | 採血point | フォロー | ボワソン | | | | | | | 浸潤性も | C-G式 | CKD-EPI | シスプラ | | | | | | | | | | 95%CI |
| Tanaka Y 2009 | 前向き | 単施設 | 疑われる | 採血point | フォロー | | | | | | | | カルボプ | CG式 | MDRD式 | 相関 | | | | | | | | | | |
| Jennings S 2010 | 後ろ向き | 単施設 | 疑われる | 採血point | フォロー | | | | | | | | 抗癌剤を | CG式 | MDRD式 | 一致率 | | | | | | | | | | |
| Launay-Vacher V | 後ろ向き | 多施設 | 疑われる | 採血point | フォロー | | | | | | | | 肺癌患者 | CG式 | MDRD式 | 腎不全の | | | | | | | | | | |
| Launay-Vacher V | 後ろ向き、単一群 | 2施設 | 疑われる | 採血point | フォロー | | | | | | | | 担癌患者 | CG式 | 単一群の | 腎不全の | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |