【4-5 評価シート 介入研究】

診療ガイドライン	CQ13-2 ビスホスホネート製剤、抗RANKL抗体は腎機能が低下した患者に対しては減量が推奨されるか？
対象	溶骨性病変を伴う骨転移
介入	ゾレドロン酸投与4mgまたは8/4mg
対照	プラセボ

＊各項目の評価は"高(-2)"、"中/疑い(-1)"、"低(0)"の3段階
まとめは"高(-2)"、"中(-1)"、"低(0)"の3段階でエビデンス総体に反映させる

各アウトカムごとに別紙にまとめる

アウトカム	血清クレアチニン上昇

個別研究		**バイアスリスク***										**非直接性***					**リスク人数(アウトカム率)**								
		選択バイアス		**実行バイアス**	**検出バイアス**	**症例減少バイアス**		**その他**																	
研究コード	**研究デザイン**	**ランダム化**	**コンシールメント**	**盲検化**	**盲検化**	**ITT**	**アウトカム不完全報告**	**選択的アウトカム報告**	**早期試験中止**	**その他のバイアス**	**まとめ**	**対象**	**介入**	**対照**	**アウトカム**	**まとめ**	**対照群分母**	**対照群分子**	**(%)**	**介入群分母**	**介入群分子**	**(%)**	**効果指標(種類)**	**効果指標(値)**	**信頼区間**
Rosen, JCO, 03 4	RCT	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0	0	0	-1	-1	163	11	6.7	165	18	10.9	HR	1.57	
Rosen, JCO, 03 8/4	RCT	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0	0	0	-1	-1	163	11	6.7	181	21	11.6	—	—	
Rosen, Cancer04 4	RCT	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0	0	0	-1	-1	163	11	6.7	165	18	10.9	HR	1.587	
Rosen, Cancer04	RCT	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0	0	0	-1	-1	163	11	6.7	181	23	12.7	HR	1.945	
Saad, JNCI, 2002 4	RCT	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0	0	0	-1	-1	208	—	11.5	214	—	15.2	RR	1.07	0.46 to 2.47
Saad, JNCI, 2002 8/4	RCT	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0	0	0	-1	-1	208	—	11.5	221	—	20.7	RR	1.76	0.79 to 3.93

コメント(該当するセルに記入)