【4-6 評価シート 観察研究】

診療ガイドライン	CQ3腎機能の低下した患者に対して毒性を軽減するために抗がん薬投与量減量は推奨されるか？
対象	抗がん剤治療を受ける成人がん患者
介入	腎機能低下
対照	腎機能正常

*バイアスリスク、非直接性
　各ドメインの評価は"高(-2)"、"中/疑い(-1)"、"低(0)"の3段階
　まとめは"高(-2)"、"中(-1)"、"低(0)"の3段階でエビデンス総体に反映させる
** 上昇要因
　各項目の評価は"高(+2)"、"中(+1)"、"低(0)"の3段階
　まとめは"高(+2)"、"中(+1)"、"低(0)"の3段階でエビデンス総体に反映させる
各アウトカムごとに別紙にまとめる

アウトカム		薬物有害事象																							
個別研究		**バイアスリスク***							**上昇要因****				**非直接性***					**リスク人数(アウトカム率)**								
		選択バイアス	**実行バイアス**	**検出バイアス**	**症例現象バイアス**	**その他**																				
研究コード	**研究デザイン**	**背景因子の差**	**ケアの差**	**不適切なアウトカム測定**	**不完全なフォローアップ**	**不十分な交絡の調整**	**その他のバイアス**	**まとめ**	**量反応関係**	**効果減弱交絡**	**効果の大きさ**	**まとめ**	**対象**	**介入**	**対照**	**アウトカム**	**まとめ**	**対照群分母**	**対照群分子**	**(%)**	**介入群分母**	**介入群分子**	**(%)**	**効果指標(種類)**	**効果指標(値)**	**信頼区間**
3910222	コホート研究	-2	-2	0	0	-2		-2	0	0	0	0	-1	0	0	-1	-1	44	NA	NA	16	NA	NA	NA	NA	NA
2.013E+09	コホート研究	-1	-2	-1	-1	-1		-1	0	0	0	0	0	0	0	-2	-2	35	NA	NA	22	NA	NA	ハザー	2.266	1.222-4.151
2.012E+09	コホート研究	-2	-2	-1	-1	-2		-2	+1	0	0	+1	-1	-1	0	-1	-1	83	35	42	6	5	83.3	NA	NA	NA
21941418	コホート研究	-2	-2	0	0	-2		-2	0	0	0	0	-2	-1	-1	-2	-2	33	0	0	8	8	100	NA	NA	NA

コメント(該当するセルに記入)

第1相試験	背景因子	RCTでは			多変量解											一部の有										
後ろ向きコホート研究		観察研究														アウトカム										
後ろ向きコホート研究	単施設、	観察研究	カルテレ		多変量解									腎機能の		一部の有										
後ろ向きコホート研究	背景因子	観察研究			多変量解								シスプラ	平均Cr値	平均Cr値	腎機能以										