【4-7 評価シート エビデンス総体】

診療ガイドライン	CQ3腎機能の低下した患者に対して毒性を軽減するために抗がん薬投与量減量は推奨されるか？
対象	抗がん剤治療を受ける成人がん患者
介入	腎機能低下
対照	腎機能正常

エビデンスの強さはRCTは"強(A)"からスタート、観察研究は弱(C)からスタート
* 各ドメインは"高(-2)"、"中/疑い(-1)"、"低(0)"の3段階
** エビデンスの強さは"強(A)"、"中(B)"、"弱(C)"、"非常に弱(D)"の4段階
*** 重要性はアウトカムの重要性(1～9)

エビデンス総体

								リスク人数(アウトカム率)											
アウトカム	**研究デザイン/研究数**	**バイアスリスク***	**非一貫性***	**不精確***	**非直接性***	**その他(出版バイアスなど)***	**上昇要因(観察研究)***	**対照群分母**	**対照群分子**	**(%)**	**介入群分母**	**介入群分子**	**(%)**	**効果指標(種類)**	**効果指標統合値**	**信頼区間**	**エビデンスの強さ****	**重要性*** **	**コメント**
薬物有害事象	6	-2		-2	-2	-2	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	非常に弱(D)		

コメント(該当するセルに記入)

			評価不能	信頼区間		十分な研													