【4-5 評価シート 介入研究】

診療ガイドライン	CQ8利尿薬投与はシスプラチンによる腎障害の予防に推奨されるか？
対象	悪性黒色腫
介入	水分負荷＋マンニトール
対照	水分負荷

＊各項目の評価は"高(-2)"、"中/疑い(-1)"、"低(0)"の3段階
まとめは"高(-2)"、"中(-1)"、"低(0)"の3段階でエビデンス総体に反映させる

各アウトカムごとに別紙にまとめる

アウトカム	血清クレアチンにん																							
個別研究	バイアスリスク*										非直接性*					リスク人数(アウトカム率)								
	選択バイアス		実行バイアス	検出バイアス	症例減少バイアス		その他																	
研究コード	研究デザイン	ランダム化	コンシールメント	盲検化	盲検化	ITT	アウトカム不完全報告	選択的アウトカム報告	早期試験中止	その他のバイアス	まとめ	対象	介入	対照	アウトカム	まとめ	対照群分母	対照群分子	(%)	介入群分母	介入群分子	(%)	効果指標(種類)	効果指標(値)	信頼区間
Al-Sarraf	RCT	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	7	21	34	1	3%			

コメント(該当するセルに記入)