

2022年2月4日

日本透析医会・日本透析医学会・日本腎臓学会
新型コロナウイルス感染対策合同委員会

委員長 菊地 勲
副委員長 山川智之
副委員長 竜崎崇和
副委員長 南学正臣

透析患者における累積の新型コロナウイルス感染者の登録数

(2022年2月3日16時 時点)

時点 患者数 地区	12/23	12/30	1/6	1/13	1/20	1/27	2/3		
	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	転帰不明数 (入院中含む)	死亡者数
北海道	183	183	183	183	183	186	199	25	79
東北	37	37	37	37	38	38	40	20	9
北関東	104	104	104	104	117	120	132	68	14
南関東 (東京除く)	490	490	490	493	510	536	605	335	79
東京	656	656	656	661	704	789	867	419	88
甲信越・北陸	54	54	54	58	58	60	62	19	11
東海 (愛知除く)	98	98	98	98	98	103	115	46	20
愛知	124	124	124	124	125	126	135	61	17
近畿 (大阪除く)	202	202	202	202	208	226	247	132	27
大阪	263	263	263	266	269	288	306	109	38
中国	94	94	94	95	106	115	133	29	10
四国	23	23	23	23	23	24	25	13	3
九州・沖縄 (福岡除く)	154	154	155	155	158	166	171	70	8
福岡	194	194	194	194	203	213	278	147	38
合計	2676	2676	2677	2693	2800	2990	3315	1493	441

東北 青森・岩手・秋田・宮城・山形・福島
北関東 茨城・栃木・群馬
南関東(東京除く) 埼玉・千葉・神奈川
甲信越・北陸 新潟・富山・石川・福井・山梨・長野
東海(愛知除く) 岐阜・静岡・三重
近畿(大阪除く) 滋賀・京都・兵庫・奈良・和歌山
中国 鳥取・島根・岡山・広島・山口
四国 徳島・香川・愛媛・高知
九州・沖縄(福岡除く) 佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄

患者の詳細情報は次ページ参照。

詳細情報は累積であり、人工呼吸器やECMOの使用既往があれば、人数に含めている。

患者詳細情報

転帰	退院 (隔離解除含む)	死亡	転帰不明 (入院中含む)	全体
患者数(腹膜透析含む)	1381	441	1493	3315
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	35	5	7	47
ワクチン1回接種・患者数	50	8	37	95
ワクチン2回接種・患者数	226	23	367	616
中和抗体薬投与・患者数	203	10	97	310

腹膜透析患者	腹膜透析	腹膜透析・ 血液透析併用
患者数	35	12

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	73	299	575	690	853	687	138	3315
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	2	8	12	12	4	7	2	47
転帰不明者数(入院中含む)	30	125	264	311	368	275	120	1493
退院・隔離解除数	43	162	282	316	333	234	11	1381
死亡者数	0	12	29	63	152	178	7	441
致死率(%)	0.0	4.0	5.0	9.1	17.8	25.9	5.1	13.3
致死率(%) (転帰不明者除く)	0.0	6.9	9.3	16.6	31.3	43.2	38.9	24.2

性別	男性	女性	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	2168	923	224	3315
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	32	13	2	47

透析歴	1年未満	1～5年未満	5～10年未満	10～15年未満	15～20年未満	20年以上	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	297	997	722	360	179	211	549	3315
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	10	22	8	2	0	1	4	47

原疾患	糖尿病性腎症	慢性糸球体腎炎	腎硬化症	その他	不明・情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	1337	530	365	406	677	3315
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	13	17	3	8	6	47

症状	あり	なし	不明・情報なし	全体
37.5℃以上の発熱	2185	594	536	3315
咳嗽	1493	1205	617	3315
咽頭痛	655	1901	759	3315
頭痛	315	2216	784	3315
鼻汁	434	2132	749	3315
嘔気・嘔吐	219	2378	718	3315
下痢	304	2304	707	3315
嗅覚味覚異常	167	2207	941	3315

肺炎像	あり	明確ではない	非施行	情報なし	全体
胸部X線	843	647	1067	758	3315
胸部CT	1253	399	957	706	3315

酸素投与	あり	なし	不明・情報なし	全体
酸素投与の有無	970	1519	826	3315
呼吸機器の有無	218	2184	913	3315
ECMOの有無	15	2367	933	3315

治療薬	あり	なし	不明・情報なし	全体
レムデシビル(ベクルリー)	417	1868	1030	3315
デキサメタゾン(デカドロン)	829	1422	1064	3315
カシリピマブ/イムデピマブ(ロナプリーブ)	159	2546	459	3315
ソトロピマブ(ゼビュディ)	151			
モルスビラビル(ラゲプリオ)	114	2906	295	3315

酸素飽和度 (COVID-19 診断時)

酸素飽和度(%)	89以下	90～93	94～95	96以上	合計
患者数(ルームエアー)	63	104	145	785	1097
患者数(酸素投与あり)	15	21	31	47	114

COVID-19 診断時または入院時検査データ

アルブミン(g/dL)	2未満	2～2.5未満	2.5～3未満	3～3.5未満	3.5以上	合計
患者数	16	66	147	288	368	885

尿素窒素(mg/dL)	30未満	30～60未満	60～90未満	90～120未満	120以上	合計
患者数	88	488	302	50	6	934

クレアチニン(mg/dL)	4未満	4～8未満	8～12未満	12～16未満	16以上	合計
患者数	42	288	356	170	77	933

CRP(mg/dL)	1未満	1～5未満	5～10未満	10～15未満	15以上	合計
患者数	299	361	165	83	72	980

白血球数(/ μ L)	3000未満	3000～10000未満	10000～15000未満	15000～20000未満	20000以上	合計
患者数	117	815	58	13	7	1010

ヘモグロビン濃度(g/dL)	9未満	9～10未満	10～11未満	11～12未満	12以上	合計
患者数	70	107	255	275	294	1001

血小板数(万/ μ L)	10未満	10～20未満	20～30未満	30～40未満	40以上	合計
患者数	176	592	187	20	27	1002

ワクチン2回接種後感染患者・詳細情報

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	11	46	113	129	176	141	0	616
退院・隔離解除数	3	19	36	50	73	45	0	226
死亡者数	0	1	2	2	8	10	0	23

中和抗体薬投与患者・詳細情報

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	10	30	75	61	83	51	0	310
退院・隔離解除数	8	22	56	40	52	25	0	203
死亡者数	0	0	0	0	5	5	0	10